

IMPIANTI FACCIALI

Gli impianti facciali vengono usati per migliorare e risollevare il contorno del volto. Spesso, questo intervento ripristina l'equilibrio armonioso del viso e contribuisce a rendervi più soddisfatti del vostro aspetto.

Attualmente possiamo disporre di un'estesa varietà di impianti, fabbricati nei più diversi materiali, che consentono di allungare la linea della mandibola oppure di armonizzare, nel contesto del viso, mento o zigomi.

ASPETTATIVE RISPETTO ALL'IMPIANTO FACCIALE

Gli impianti facciali possono apportare un maggior equilibrio al vostro viso ed accentuare la vostra autostima. Se desiderate migliorare il vostro aspetto, senza pensare di poter raggiungere la perfezione assoluta, e nutrite aspettative realistiche, probabilmente l'impianto facciale sia la vostra scelta vincente.

Questi impianti vengono usati spesso per rendere più armoniosa la fisionomia dei pazienti più giovani, come nel caso di adolescenti che desiderano rimodellare il naso o rialzare il mento per riequilibrare le proporzioni del proprio volto. Mentre pazienti più maturi possono associare questo intervento ad altre procedure correttive. Per esempio, nel corso di un lifting facciale, si possono applicare impianti agli zigomi, per ripristinare un aspetto più giovanile. Gli impianti possono rappresentare la soluzione giusta anche per i casi di "volto scavato" o dall'aspetto stanco.

POSSIBILI COMPLICANZE INERENTI L'INTERVENTO

Le modificazioni apportate da questo intervento sono rilevanti. Normalmente non insorgono complicanze, è comunque importante che siate informati sulla loro possibile presenza. Questa brochure vi indicherà alcune complicanze postoperatorie, ma non intendiamo fornire una lista dettagliata e completa dei rischi potenziali.

Un impianto facciale può, a volte, dislocarsi, rendendo necessario un secondo intervento per riallinearlo. Qualsiasi operazione comporta un rischio di infezione. Qualora si sviluppasse un'infezione nella zona dell'impianto, non risolvibile con un trattamento a base di antibiotici, si renderà necessaria la rimozione temporanea dell'impianto, che verrà poi riposizionato in un secondo tempo. Vi sono, inoltre, altri rischi, estremamente meno frequenti, associati ad impianti specifici.

Alcuni materiali usati negli impianti sono stati fabbricati con silicone solido. Al momento non esistono prove scientifiche che dimostrino che la sostanza possa essere nociva.

PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

Può essere utile consegnarci immagini o foto di persone la cui fisionomia facciale sia simile a quella desiderata.

Dovrete assicurarvi di aver compreso correttamente tutti i particolari concernenti l'intervento da eseguire e le fasi del periodo di recupero, oltre al costo che comporta.

Nell'ambito della preparazione all'intervento, dovrete informarvi sulle modalità di trasporto per il ritorno al vostro domicilio, qualora non possiate guidare. Sarete poi informati sulla necessità eventuale di astenervi dal cibo e dai liquidi sin dalla notte che precede l'intervento e sulla opportunità di ingerire farmaci, come l'aspirina o altri medicinali simili. Vi può essere indicato di assumere antibiotici orali prima e dopo l'operazione per aumentare le difese contro le possibili infezioni.

INFORMAZIONI SULL'INTERVENTO

Quasi tutti gli interventi che prevedono impianti facciali (mento o zigomi) sono eseguiti in clinica. Si può essere operati come pazienti interni o esterni, la procedura dipenderà dall'entità dell'intervento e dalla anestesia applicata.

L'impianto facciale può essere eseguito in anestesia generale o locale con sedazione

MENTO

L'intervento per l'impianto di una protesi al mento richiede da 30 minuti ad un'ora. L'impianto in grado di garantire un miglioramento del vostro aspetto viene inserito in una tasca nell'area subito davanti al mento. La piccola incisione necessaria per formare la tasca e collocare l'impianto viene praticata all'interno della bocca (lungo il labbro inferiore) oppure nel tessuto sottostante l'area del mento.

Al termine dell'intervento si applica all'incisione un nastro chirurgico, per ridurre il gonfiore ed il fastidio. Le suture saranno rimosse entro cinque-sette giorni. Se l'incisione praticata è endo-orale, i punti di sutura vengono riassorbiti.

Il fastidio ed il gonfiore che accompagnano i primi giorni tendono presto a scomparire. È normale avvertire una certa temporanea difficoltà a ridere o parlare. Lividi scuri e bluastri possono apparire intorno al mento ed al collo. Il vostro chirurgo vi fornirà tutte le indicazioni opportune sull'igiene orale, l'alimentazione e le restrizioni alle normali attività richieste da questo intervento.

ZIGOMI

L'intervento sugli zigomi ha una durata media che varia da 30 a 60 minuti. Se l'intervento viene eseguito insieme ad altre procedure correttive, come una blefaroplastica oppure un lifting facciale o frontale, vengono utilizzate le stesse incisioni praticate per gli altri interventi, altrimenti l'incisione può essere praticata all'interno del labbro superiore o sulla palpebra inferiore. Attraverso l'incisione si allestisce una tasca e vi si inserisce la protesi.

Al termine dell'intervento, viene applicata una medicazione compressiva per ridurre il fastidio ed il gonfiore. L'intensità e la durata di questi effetti varia

considerevolmente, in particolare in funzione della contemporanea realizzazione di altre procedure.

Nel periodo postoperatorio, vi saranno indicate restrizioni alimentari e delle attività. Anche in questo caso, queste istruzioni varieranno secondo il tipo di intervento collaterale eventualmente realizzato. Tuttavia è bene sapere che la vostra capacità di movimento delle labbra e della bocca potrebbe diminuire per un periodo. I punti di sutura all'interno della bocca si dissolvono dopo circa dieci giorni.

MANDIBOLA INFERIORE

L'inserimento di un impianto mandibolare dura uno o due ore. Le incisioni interne vengono praticate su entrambi i lati dal labbro inferiore per consentire l'accesso necessario a formare una tasca all'interno della quale inserire l'impianto. Le incisioni vengono poi chiuse con punti di sutura riassorbibili.

Subito dopo l'intervento, il gonfiore è notevole e tende ad aumentare fino a raggiungere il massimo nelle 24-48 ore seguenti. Il gonfiore si attenua dopo alcuni giorni, tuttavia, per alcuni mesi, perdurerà un leggero gonfiore che non vi consentirà di individuare il vostro contorno facciale definitivo.

Nel corso del processo di guarigione le vostre attività dovranno essere limitate, così come la vostra dieta alimentare. La capacità di movimento delle labbra e della bocca potrebbe essere limitata per alcuni giorni.

RIPRESA DELL'ATTIVITÀ NORMALE

Tenete sempre presente che, come in qualsiasi intervento di chirurgia facciale, dopo un breve periodo vi sentirete meglio ed il vostro aspetto migliorerà notevolmente. Per qualche settimana non sarà, comunque, indicato intraprendere attività che possano comportare colpi o urti sulla regione facciale.

IL VOSTRO NUOVO LOOK

Forse non sarete in grado di valutare con precisione il vostro aspetto per settimane o, perfino, mesi. Abituatevi al vostro nuovo aspetto senza fretta.

Scoprirete con sorpresa che la maggior parte dei vostri conoscenti non si renderà conto della presenza di un impianto protesico, noterà, invece, il miglioramento del vostro aspetto.